

# SRS-2™

Social Responsiveness Scale™

**Demo rapport**

**ID 151346-5**

**Dato 23.11.2022**

Førskole

2. udgave

# Oversigt

SRS-2 af John N. Constantino og Christian P. Gruber. Copyright © Western Psychological Services, 2012. Dansk udgave © Hogrefe Psykologisk Forlag, 2016.

SRS-2 har til formål at understøtte diagnosticering og behandling af ASF og andre sociale kommunikationsvanskeligheder. Beslutninger om diagnoser eller behandling bør ikke træffes udelukkende på basis af informationerne i denne rapport. Brugeren af denne rapport bør være bekendt med vejledningen til SRS-2; se kap. 2 for scoring og kap. 3 for fortolkning af testen.

Anvendelse af SRS-2 i både klinisk og forskningsmæssig sammenhæng bør altid foregå i henhold til gældende etiske og professionelle retningslinjer for de psykologisk-pædagogiske fagområder, som Dansk Psykolog Forening har opstillet. Som med alle andre psykologiske test bør SRS-2 ikke administreres uden informeret samtykke fra testpersonen eller vedkommendes forældre/værge, hvis det drejer sig om en umyndig. Brugere bør tage de nødvendige forholdsregler for at sikre testresultaternes fortrolighed og kun lade relevante personer få adgang til dem. Tilbage melding af resultater til personer, der er blevet undersøgt, eller disses forældre/værge bør fokusere på fortolkning og anbefalinger til behandling snarere end de specifikke test scores.

## Rapportens opbygning


- **Profil**
- **Skalaoversigt**
- **Skaladetaljer**

Fortolkningen af de følgende testresultater bør kun foretages af brugere, der er kvalificeret hertil i kraft af uddannelse eller via certificeringsforløb. Vær opmærksom på gældende retningslinjer inden for de relevante fagområder samt for behandling og opbevaring af persondata.

# Profil

## Social Responsiveness Scale™ · Førskole

Førskole – forældre: Almen · T-Score (50+10z)



# Skalaoversigt

Social Responsiveness Scale™ · Førskole

Førskole – forældre: Almen · T-Score (50+10z)


Skalaer	Råpoint	Normscore
Social bevidsthed	14	77,6
Social kognition	14	69,2
Social kommunikation	21	72,8
Social motivation	10	63,2
Begrænsede interesser og repetitiv/stereotypisk adfærd	1	43,2
Social kommunikation og social interaktion	59	74,7
TOTAL	60	67,9

# Skaladetaljer

## Social bevidsthed

Førskole – forældre: Almen · T-Score (50+10z)

Råpoint	14
Normscore	77,6
Manglende svar	0
Konfidensinterval	[63,2 - 92]



### SRS-2 Behandlingssubskalaer


SRS-2 omfatter behandlingssubskalaer. Anvendelse af disse subskalaer bør grundlæggende være begrænset til forskning eller kliniske undersøgelser, som specifikt har til formål at lindre symptomer. Den foreliggende dokumentation understøtter ikke individuel fortolkning af subskalaerne; dvs. at en diskussion om subskalascorers ikke typisk vil være en del af den kliniske fortolkning, med mindre denne omfatter behandlingsplanlægning.

**Social bevidsthed (BEV):** Evnen til at opfatte sociale signaler; denne kategori repræsenterer de sensoriske aspekter af social gensidighed.

## Social kognition

Førskole – forældre: Almen · T-Score (50+10z)

Råpoint	14
Normscore	69,2
Manglende svar	0
Konfidensinterval	[58,5 - 79,9]



### SRS-2 Behandlingssubskalaer


SRS-2 omfatter behandlingssubskalaer. Anvendelse af disse subskalaer bør grundlæggende være begrænset til forskning eller kliniske undersøgelser, som specifikt har til formål at lindre symptomer. Den foreliggende dokumentation understøtter ikke individuel fortolkning af subskalaerne; dvs. at en diskussion om subskalascorers ikke typisk vil være en del af den kliniske fortolkning, med mindre denne omfatter behandlingsplanlægning.

**Social kognition (KOG):** Evne til at fortolke sociale signaler, efter de er opfattet; denne kategori repræsenterer de kognitivt-fortolkende aspekter af social gensidighed.

## Social kommunikation

Førskole – forældre: Almen · T-Score (50+10z)

Råpoint	21
Normscore	72,8
Manglende svar	0
Konfidensinterval	[63,6 - 82]



### SRS-2 Behandlingsubskalaer


SRS-2 omfatter behandlingssubskalaer. Anvendelse af disse subskalaer bør grundlæggende være begrænset til forskning eller kliniske undersøgelser, som specifikt har til formål at lindre symptomer. Den foreliggende dokumentation understøtter ikke individuel fortolkning af subskalaerne; dvs. at en diskussion om subskalascorers ikke typisk vil være en del af den kliniske fortolkning, med mindre denne omfatter behandlingsplanlægning.

**Social kommunikation (KOM):** Inkluderer ekspresiv social kommunikation; denne kategori repræsenterer de "motoriske" aspekter af social gensidighed.

## Social motivation

Førskole – forældre: Almen · T-Score (50+10z)

Råpoint	10
Normscore	63,2
Manglende svar	0
Konfidensinterval	[51,9 - 74,5]



### SRS-2 Behandlingsubskalaer


SRS-2 omfatter behandlingssubskalaer. Anvendelse af disse subskalaer bør grundlæggende være begrænset til forskning eller kliniske undersøgelser, som specifikt har til formål at lindre symptomer. Den foreliggende dokumentation understøtter ikke individuel fortolkning af subskalaerne; dvs. at en diskussion om subskalascorers ikke typisk vil være en del af den kliniske fortolkning, med mindre denne omfatter behandlingsplanlægning.

**Social motivation (MOT):** I hvilket omfang testpersonen generelt er motiveret til at engagere sig i social og interpersonel adfærd; elementer af social angst, hæmning og empatisk orientering/empati er at finde blandt disse udsagn.

## Begrænsede interesser og repetitiv/stereotypisk adfærd

Førskole – forældre: Almen · T-Score (50+10z)

Råpoint	1
Normscore	43,2
Manglende svar	0
Konfidensinterval	[35,6 - 50,8]



### SRS-2 Behandlingssubskalaer

SRS-2 omfatter behandlingssubskalaer. Anvendelse af disse subskalaer bør grundlæggende være begrænset til forskning eller kliniske undersøgelser, som specifikt har til formål at lindre symptomer. Den foreliggende dokumentation understøtter ikke individuel fortolkning af subskalaserne; dvs. at en diskussion om subskalascorer ikke typisk vil være en del af den kliniske fortolkning, med mindre denne omfatter behandlingsplanlægning.

**Begrænsede interesser og repetitiv adfærd (BIRA):** Inkluderer stereotyp adfærd eller stærkt begrænsede interesser, der er karakteristiske for autisme.


### SRS-2 DSM-5-kompatible subskalaer

I overensstemmelse med kriterierne i DSM-5 er SRS-2 forsynet med to subskalaer, som svarer til de to symptomdomæner: social kommunikation og interaktion (SKI) samt begrænsede interesser og repetitiv adfærd (BIRA).

## Social kommunikation og social interaktion

Førskole – forældre: Almen · T-Score (50+10z)

Råpoint	59
Normscore	74,7
Manglende svar	0
Konfidensinterval	[68,2 - 81,2]




### SRS-2 DSM-5-kompatible subskalaer

I overensstemmelse med kriterierne i DSM-5 er SRS-2 forsynet med to subskalaer, som svarer til de to symptomdomæner: social kommunikation og interaktion (SKI) samt begrænsede interesser og repetitiv adfærd (BIRA).

# TOTAL

## Førskole – forældre: Almen · T-Score (50+10z)

Råpoint	60
Normscore	67,9
Manglende svar	0
Konfidensinterval	[62,4 - 73,4]



**0-59T: Resultatet ligger inden for normalområdet.** Scores inden for dette interval er generelt ikke associeret med klinisk signifikant ASF.

**60-65T: Resultatet er lettere forhøjet.** Scores inden for dette interval indikerer mangelfuld social gensidighed, der er klinisk signifikant, og som kan medføre lette til moderate vanskeligheder med sociale interaktioner i hverdagen.

**66-75T: Resultatet er middelsvært forhøjet.** Scores inden for dette interval indikerer mangelfuld social gensidighed, der er klinisk signifikant, og som kan medføre betydelige vanskeligheder med sociale interaktioner i hverdagen. Disse scores er typiske for børn med ASF af moderat sværhedsgrad.

**76T og derover: Resultatet er svært forhøjet.** Scores inden for dette interval indikerer mangelfuld social gensidighed, der er klinisk signifikant, og som kan medføre svære vanskeligheder med sociale interaktioner i hverdagen. Disse scores er stærkt associeret med den kliniske diagnose ASF.