

SRS-2™



Social Responsiveness Scale™

Multirapport

2. udgave

Oversigt

Måleredskaber / Personer

Navn	Alder	Køn	Test	Dato	Varighed	Linjetype
Demo rapport	45;0	M	SRS-2™ Voksen (selvrapportering)	23.11.2022	0.032	
			SRS-2™ Voksen (anden)	23.11.2022	0.032	

Rapportens opbygning

- Profil
- Skaladetaljer


Fortolkningen af de følgende testresultater bør kun foretages af brugere, der er kvalificeret hertil i kraft af uddannelse eller via certificeringsforløb. Vær opmærksom på gældende retningslinjer inden for de relevante fagområder samt for behandling og opbevaring af persondata.

Profil

Social Responsiveness Scale™

Voksen (selvrapportering) · Voksen – selvrapportering: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)

Voksen (anden) · Voksen – anden: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)



—◆— Demo rapport (45;0, M)

—■—

SRS-2™ Voksen (selvrapportering)

SRS-2™ Voksen (anden)

23.11.2022 14:22:12


23.11.2022 14:21:41

Skaladetaljer

Social bevidsthed

Voksen (selvrapportering) · Voksen – selvrapportering: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)

Voksen (anden) · Voksen – anden: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)



	Navn	Test	Råpoint	Normscore	Manglende svar	Konfidensinterval
—◆—	Demo rapport	SRS-2™ Voksen (selvrapportering)	10	68,5	0	56,1 - 80,9
—■—		SRS-2™ Voksen (anden)	11	67,4	0	52,5 - 82,3

SRS-2 Behandlingssubskalaer


SRS-2 omfatter behandlingssubskalaer. Anvendelse af disse subskalaer bør grundlæggende være begrænset til forskning eller kliniske undersøgelser, som specifikt har til formål at lindre symptomer. Den foreliggende dokumentation understøtter ikke individuel fortolkning af subskalaerne; dvs. at en diskussion om subskalascorers ikke typisk vil være en del af den kliniske fortolkning, med mindre denne omfatter behandlingsplanlægning.

Social bevidsthed (BEV): Evnen til at opfatte sociale signaler; denne kategori repræsenterer de sensoriske aspekter af social gensidighed.

Social kognition

Voksen (selvrapportering) · Voksen – selvrapportering: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)

Voksen (anden) · Voksen – anden: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)



	Navn	Test	Råpoint	Normscore	Manglende svar	Konfidensinterval
—◆—	Demo rapport	SRS-2™ Voksen (selvrapportering)	12	62,4	0	52,2 - 72,6
—■—		SRS-2™ Voksen (anden)	18	69,9	0	62,1 - 77,7

SRS-2 Behandlingsubskalaer


SRS-2 omfatter behandlingssubskalaer. Anvendelse af disse subskalaer bør grundlæggende være begrænset til forskning eller kliniske undersøgelser, som specifikt har til formål at lindre symptomer. Den foreliggende dokumentation understøtter ikke individuel fortolkning af subskalaerne; dvs. at en diskussion om subskalascorers ikke typisk vil være en del af den kliniske fortolkning, med mindre denne omfatter behandlingsplanlægning.



Social kognition (KOG): Evne til at fortolke sociale signaler, efter de er opfattet; denne kategori repræsenterer de kognitivt-fortolkende aspekter af social gensidighed.

Social kommunikation

Voksen (selvrapportering) · Voksen – selvrapportering: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)

Voksen (anden) · Voksen – anden: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)



Navn	Test	Råpoint	Normscore	Manglende svar	Konfidensinterval
 Demo rapport	SRS-2™ Voksen (selvrapportering)	25	67,4	0	60,9 - 73,9
	SRS-2™ Voksen (anden)	25	66,6	0	59 - 74,2

SRS-2 Behandlingsubskalaer


SRS-2 omfatter behandlingssubskalaer. Anvendelse af disse subskalaer bør grundlæggende være begrænset til forskning eller kliniske undersøgelser, som specifikt har til formål at lindre symptomer. Den foreliggende dokumentation understøtter ikke individuel fortolkning af subskalaerne; dvs. at en diskussion om subskalascorers ikke typisk vil være en del af den kliniske fortolkning, med mindre denne omfatter behandlingsplanlægning.

Social kommunikation (KOM): Inkluderer ekspressiv social kommunikation; denne kategori repræsenterer de "motoriske" aspekter af social gensidighed.

Social motivation

Voksen (selvrapportering) · Voksen – selvrapportering: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)

Voksen (anden) · Voksen – anden: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)



	Navn	Test	Råpoint	Normscore	Manglende svar	Konfidensinterval
—◆—	Demo rapport	SRS-2™ Voksen (selvrapportering)	12	56,9	0	49,6 - 64,2
—■—		SRS-2™ Voksen (anden)	9	54,7	0	46,2 - 63,2

SRS-2 Behandlingssubskalaer


SRS-2 omfatter behandlingssubskalaer. Anvendelse af disse subskalaer bør grundlæggende være begrænset til forskning eller kliniske undersøgelser, som specifikt har til formål at lindre symptomer. Den foreliggende dokumentation understøtter ikke individuel fortolkning af subskalarene; dvs. at en diskussion om subskalarescores ikke typisk vil være en del af den kliniske fortolkning, med mindre denne omfatter behandlingsplanlægning.

Social motivation (MOT): I hvilket omfang testpersonen generelt er motiveret til at engagere sig i social og interpersonel adfærd; elementer af social angst, hæmning og empatisk orientering/empati er at finde blandt disse udsagn.

Begrænsede interesser og repetitiv/stereotypisk adfærd

Voksen (selvrapportering) · Voksen – selvrapportering: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)

Voksen (anden) · Voksen – anden: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)



Navn	Test	Råpoint	Normscore	Manglende svar	Konfidensinterval	
—◆—	Demo rapport	SRS-2™ Voksen (selvrapportering)	6	49,5	0	41,4 - 57,6
—■—		SRS-2™ Voksen (anden)	4	48,3	0	40,2 - 56,4

SRS-2 Behandlingssubskalaer

SRS-2 omfatter behandlingssubskalaer. Anvendelse af disse subskalaer bør grundlæggende være begrænset til forskning eller kliniske undersøgelser, som specifikt har til formål at lindre symptomer. Den foreliggende dokumentation understøtter ikke individuel fortolkning af subskalaerne; dvs. at en diskussion om subskalascorers ikke typisk vil være en del af den kliniske fortolkning, med mindre denne omfatter behandlingsplanlægning.

Begrænsede interesser og repetitiv adfærd (BIRA): Inkluderer stereotyp adfærd eller stærkt begrænsede interesser, der er karakteristiske for autisme.


SRS-2 DSM-5-kompatible subskalaer

I overensstemmelse med kriterierne i DSM-5 er SRS-2 forsynet med to subskalaer, som svarer til de to symptomdomæner: social kommunikation og interaktion (SKI) samt begrænsede interesser og repetitiv adfærd (BIRA).

Social kommunikation og social interaktion

Voksen (selvrapportering) · Voksen – selvrapportering: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)

Voksen (anden) · Voksen – anden: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)



	Navn	Test	Råpoint	Normscore	Manglende svar	Konfidensinterval
—◆—	Demo rapport	SRS-2™ Voksen (selvrapportering)	59	65,1	0	60,3 - 69,9
—■—		SRS-2™ Voksen (anden)	63	66,7	0	61,5 - 71,9


SRS-2 DSM-5-kompatible subskalaer

I overensstemmelse med kriterierne i DSM-5 er SRS-2 forsynet med to subskalaer, som svarer til de to symptomdomæner: social kommunikation og interaktion (SKI) samt begrænsede interesser og repetitiv adfærd (BIRA).

TOTAL

Voksen (selvrapportering) · Voksen – selvrapportering: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)

Voksen (anden) · Voksen – anden: Almen · T-Score (50+10z) (Original: T-Score)



Navn	Test	Råpoint	Normscore	Manglende svar	Konfidensinterval	
—◆—	Demo rapport	SRS-2™ Voksen (selvrapportering)	65	62,1	0	57,7 - 66,5
—■—		SRS-2™ Voksen (anden)	67	62,2	0	57,4 - 67

0-59T: Resultatet ligger inden for normalområdet. Scores inden for dette interval er generelt ikke associeret med klinisk signifikant ASF.

60-65T: Resultatet er lettere forhøjet. Scores inden for dette interval indikerer mangelfuld social gensidighed, der er klinisk signifikant, og som kan medføre lette til moderate vanskeligheder med sociale interaktioner i hverdagen.

66-75T: Resultatet er middelsvært forhøjet. Scores inden for dette interval indikerer mangelfuld social gensidighed, der er klinisk signifikant, og som kan medføre betydelige vanskeligheder med sociale interaktioner i hverdagen. Disse scores er typiske for personer med ASF af moderat sværhedsgrad.

76T og derover: Resultatet er svært forhøjet. Scores inden for dette interval indikerer mangelfuld social gensidighed, der er klinisk signifikant, og som kan medføre svære vanskeligheder med sociale interaktioner i hverdagen. Disse scores er stærkt associeret med den kliniske diagnose ASF.