

Remission, Response und deren Prädiktion nach einer Dialektisch-Behavioralen Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung im stationären Setting

Christoph Kröger¹, Susanne Harbeck², Imke Rickert¹, Eileen Wollburg³,
Katrin Gersch², Michael Armbrust² und Sören Kliem¹

¹Abteilung Klinische Psychologie, Psychotherapie und Diagnostik, Technische Universität Braunschweig

²Schön Klinik Bad Bramstedt

³Penn State Altoona

Tabelle. Komorbide psychische Störungen (ICD-10)

	N = 366	
	n	%
Affektive Störungen	346	94,54
Depressive Episoden	341	93,17
Dysthymia	11	3,01
Bipolare Störungen	3	0,82
Substanzstörungen	82	22,40
Alkohol Missbrauch/Abhängigkeit	52	14,21
Substanz Missbrauch/Abhängigkeit	44	12,02
Angststörungen	152	41,53
Panikstörung	6	1,64
Agoraphobie	30	8,20
Soziale Phobie	64	17,49
Spezifische Phobie	3	0,82
Zwangsstörung	23	6,28
Posttraumatische Belastungsstörung	42	11,48
Generalisierte Angststörung	3	0,82
Somatoforme Störungen	25	6,83
Somatisierungsstörung	3	0,82
Hypochondrische Störung	3	0,82
Anhaltende somatoforme Schmerzstörung	6	1,64
Essstörungen	158	43,17
Anorexia nervosa	8	2,19
Bulimia nervosa	57	15,57
Essstörung NNB	87	23,77

Anmerkungen: Affektive Störungen = F3x.x; depressive Episode = F32.x, F33.x; Dysthymia = F34.1; Bipolare Störung = F31.x; Substanzstörung = F1x.x; Alkohol Missbrauch/Abhängigkeit = F10.1x, F10.2x; Angststörungen = F40.x, F41.x, F42.x, F43.1; Panikstörung = F41.0x; Agoraphobie = F40.0x; Soziale Phobie = F40.1; Spezifische Phobie = F40.2; Zwangsstörung = F42.x; Posttraumatische Belastungsstörung = F43.1; Generalisierte Angststörung = F41.1; Somatoforme Störungen = F45.x; Somatisierungsstörung = F45.0; Hypochondrische Störung = F45.2x; Anhaltende somatoforme Schmerzstörung = F45.4; Essstörungen = F50.x; Anorexia nervosa = F50.0x, F50.1; Bulimia nervosa = F50.2, F50.3; Essstörung NNB = F50.9.