




DRS-2

Escala de Avaliação da Demência - 2

A DRS-2 fornece uma medida geral de capacidade cognitiva para adultos com alterações neurológicas corticais ou subcorticais de tipo degenerativo. É um dos instrumentos de avaliação de demências mais utilizados, internacionalmente, na prática clínica.



Paul J. Jurica, Christopher L. Leitten, Steven Mattis

DRS-2

Escala de Avaliação da Demência - 2

A DRS-2 foi desenvolvida para medir níveis de funcionamento cognitivo baixos. É abrangente em termos de funções cognitivas superiores avaliadas e permite diferenciar diferentes níveis de capacidade em doentes com demência.

Ano do Copyright

2011

População

Adultos e idosos

Idades

A partir dos 50 anos

Administração

Individual

Tempo de aplicação

Variável

Versões

Papel-e-lápis

Correção

Manual e informatizada

Outras línguas disponíveis

Inglês

Qualificação dos Utilizadores

C


É útil na deteção precoce, no diagnóstico diferencial e na classificação de estágio de evolução da demência. Tem uma elevada capacidade de identificação de doentes com demência e, simultaneamente, tem um baixo nível de falsos positivos. Estudos efetuados demonstram que a DRS-2 é sensível ao declínio cognitivo em doentes com demência grave de tipo Alzheimer e adequada na deteção de défices cognitivos associados com a doença de Parkinson ou para prever alterações nas atividades de vida diária dos doentes de Parkinson.

A DRS-2 é constituída por 36 tarefas e 32 estímulos, organizados em cinco subescalas que permitem obter informação acerca de capacidades específicas:

- Atenção;
- Iniciação/Perseveração;
- Construção;
- Conceptualização;
- Memória;
- Nível geral do funcionamento cognitivo.

Dentro de cada subescala, as tarefas mais difíceis são apresentadas no início. Em geral, se as primeiras, uma ou duas, tarefas são realizadas com sucesso, atribui-se crédito às tarefas seguintes dessa subescala e prossegue-se para a subescala seguinte. Este procedimento permite a redução do tempo total de aplicação da bateria em indivíduos sem alterações significativas. A administração da DRS-2 a idosos normais demora aproximadamente 10 a 15 minutos. Doentes com demência poderão demorar 30 a 45 minutos para completar a escala.

Adaptação, validação e estudo normativo para a população portuguesa realizados por Sara Cavaco e Armando Teixeira-Pinto.



Caderno de estímulos

Caderno de registo

Output ficheiro Excel

Perfil de resultados

Contextos de Aplicação

Clínico



Normas

A **tipificação portuguesa** utiliza a escala percentilica e pontuações escalares. Dados recolhidos em 2011:

- Tabela de normas para indivíduos analfabetos;
- Tabelas de Normas para indivíduos com mais de 2 anos de escolaridade.



Material

DRS-2_ Kit Inicial (inclui Manual, Caderno de estímulos e 25 Cadernos de registo)

DRS-2_ Cadernos de registo (pacote de 25)

Preços dos materiais
podem ser consultados
em **www.hogrefe.pt**

Hogrefe Publishing Group

Göttingen · Berne · Vienna · Oxford · Paris
Boston · Amsterdam · Prague · Florence
Copenhagen · Stockholm · Helsinki · Oslo
Madrid · Barcelona · Seville · Bilbao
Zaragoza · São Paulo · Lisbon

www.hogrefe.com